

Por un mundo lleno de **Amor Inmunizado**



Cartilla de vacunación Cajasan

En la IPS Cajasan, protegemos y mejoramos la salud de las familias santandereanas, por eso, ejecutamos activamente campañas de vacunación en todo el departamento, que ayudan a mantener nuestro mundo más sano y saludable.

Las vacunas son unos de los logros más trascendentales de la historia de la salud pública, gracias a ellas, se han salvado la vida de millones de niños, brindando la oportunidad de gozar una vida más larga y saludable.

¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas?

Las vacunas pueden tener efectos secundarios leves, tras la primera o la segunda dosis. Esto podría causar:

- Dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar donde se administró la inyección.
- Fiebre.
- Fatiga
- Malestar general.

La mayoría de los efectos secundarios desaparecen a los pocos días. Estos síntomas, muestran que el sistema inmunológico está trabajando en producir las defensas necesarias para atacar un virus determinado.

Vacunas para recién nacidos

La llegada de un nuevo miembro a la familia es muy importante para todos, por eso, es fundamental protegerlo con las vacunas desde el primer momento.

Las vacunas contra la **Hepatitis B** y la **Tuberculosis**, son las primeras que se deben aplicar a los recién nacidos, por ende, los padres reciben un carné de vacunación con la anotación de las vacunas que se colocaron en el nacimiento con el respectivo nombre y fecha.

Vacunas PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones)

- Hepatitis B.
- BCG.



Vacunas para los 2 meses

A esta edad el bebé se ha desarrollado sanamente, gracias a la ayuda del ejército de defensas, que ofrecen las vacunas aplicadas en su nacimiento. Para continuar fortaleciendo e inmunizando, se recomienda aplicar el esquema de vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y de las vacunas complementarias.

Vacunas PAI

- Polio intramuscular.
- Pentavalente.
- Rotavirus monovalente.
- Neumococo trecevalente.

Vacunas complementarias

- Hexavalente acelular.
- Meningococo tetravalente.
- Neumococo trecevalente.
- Rotavirus pentavalente.

Vacunas para los 4 meses

En esta nueva etapa, los padres o acudientes deben estar muy atentos para aplicar el siguiente esquema de vacunación y obtener una mayor protección.

Vacunas PAI

- Polio intramuscular.
- Pentavalente.
- Rotavirus monovalente.
- Neumococo trecevalente.

Vacunas complementarias

- Hexavalente acelular.
- Meningococo tetravalente.
- Neumococo trecevalente.
- Rotavirus pentavalente.



Vacunas para los 6 meses

En este momento el bebé comienza una serie de cambios, como la ingesta de alimentos distintos a la leche materna, desarrolla la capacidad para sentarse e inicia una nueva etapa de exploración, por eso, requiere la protección adicional de las siguientes vacunas.

Vacunas PAI

- Polio intramuscular.
- Pentavalente.
- Influenza.

Vacunas complementarias


- Hexavalente acelular.
- Influenza tetravalente.
- Rotavirus pentavalente.
- Neumococo trecevalente.

Vacunas para los 7 meses

A esta edad el bebé estará más fuerte, ágil y protegido gracias a la inmunización recibida en los meses anteriores, sin embargo, es muy importante continuar con su desarrollo inmunológico.

Vacunas PAI

- Influenza.



Vacunación para los 12 meses

Al completar el primer año de vida del bebé, su sistema inmune estará más fortalecido; para continuar con su óptimo desarrollo, es altamente recomendable seguir el esquema de vacunación, con el cual podrá combatir nuevos agentes infecciosos.

Vacunas PAI

- Triple viral (rubéola, sarampión, papera).
- Hepatitis A.
- Neumococo trecevalente.
- Influenza anual.
- Varicela.

Vacunas complementarias

- Hepatitis A.
- Neumococo trecevalente.
- Influenza tetravalente anual.
- MMR no PAI + varicela (PROQUAD)



Vacunación para los 18 meses

A esta edad los niños se están preparando inmunológicamente para entrar a preescolar, donde estarán expuestos a gérmenes y virus, por lo que es de gran importancia fortalecer sus defensas.

Vacunas PAI

- Polio intramuscular.
- Pentavalente.
- Fiebre amarilla.
- Triple viral.

Vacunas no complementarias

- Pentavalente acelular.
- Fiebre amarilla.
- Triple viral.



Vacunación de 2 a 5 años

Al llegar a esta etapa, el contacto y socialización con otras personas es constante, por eso, es necesario seguir fortaleciendo el sistema inmune completando el esquema.

Vacunas PAI

- Influenza.

Vacunas complementarias

- Influenza tetravalente.

Vacunación a los 5 años

Al completar esta edad, es importante y fundamental que todos los niños tengan las vacunas que ayudan a protegerlos contra las enfermedades.

Vacunas PAI

- Polio intramuscular.
- DPT.
- Triple viral.
- Varicela

Vacunas complementarias

- Tetravalente acelular.
- DPT acelular.
- Triple viral no PAI.
- Influenza tetravalente.
- Varicela.
- MMR triple viral no PAI + varicela (PROQUAD).



¡Para mayor información,
ingresa a www.cajasan.com
o escanea el código QR!



Protegemos la felicidad y el bienestar
de las familias santandereanas.

Contacto:

IPS Cajasan Bucaramanga

Diagonal 16 #59-56,
Ciudadela Real de Minas.
607 643 4444 Ext. 4739 - 4720.
300 223 3994 - 300 302 5431.

IPS Cajasan Barrancabermeja

Calle 57 #27-15, barrio Galán.
607 643 4444 Ext. 4809.
300 578 5065 - 301 791 6344.

